

「若年性認知症ハンドブック」修正箇所一覧表（令和4年3月 改訂5版）

頁	修正後	修正前																																																																						
全体	誤字、文言、書式等の軽微な修正を行いました。	—																																																																						
P7	企業の障害者雇用 一般企業では、労働者の <u>2.3%</u> 以上の障害者を雇用することが義務付けられています。また、特殊法人と国・地方公共団体では <u>2.6%</u> 、都道府県等の教育委員会では <u>2.5%</u> 以上となっています（ <u>R3.3.1</u> 改正）。	企業の障害者雇用 一般企業では、労働者の <u>2.2%</u> 以上の障害者を雇用することが義務付けられています。また、特殊法人と国・地方公共団体では <u>2.5%</u> 、都道府県等の教育委員会では <u>2.4%</u> 以上となっています（ <u>H30.4.1</u> 改正）。																																																																						
P22	http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079293.html	http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html																																																																						
P39	認知症疾患医療センター 認知症を専門とする医師がおり、診断、治療方針の選定、入院も可能な医療機関で、全国で <u>488</u> か所（ <u>令和3年10月</u> 現在）設置されています。	認知症疾患医療センター 認知症を専門とする医師がおり、診断、治療方針の選定、入院も可能な医療機関で、全国で <u>468</u> か所（ <u>令和2年4月</u> 現在）設置されています。																																																																						
P43	<p style="text-align: center;">認知症の治療薬の一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一般名</th> <th>ドネペジル</th> <th>ガラントアミン</th> <th>リバスチグミン</th> <th>メマンチン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>商品名</th> <td>アリセプト</td> <td>レミニール</td> <td>リバスタッチイクセロン</td> <td>メモリー</td> </tr> <tr> <th>薬効</th> <td colspan="4">認知症の中核症状の進行をある程度遅らせる</td> </tr> <tr> <td></td> <td>抑うつや無関心にも効果</td> <td>神経伝達物質の分泌を促進</td> <td>貼付薬のため、使用しやすい <small>*服用法が正しく守られていること</small></td> <td>興奮や攻撃性に効果</td> </tr> <tr> <th>主な副作用</th> <td colspan="2">消化器症状(悪心、下痢)</td> <td>皮膚症状</td> <td>めまい、頭痛、傾眠</td> </tr> <tr> <th>適応</th> <td>軽度～高度</td> <td colspan="2">軽度・中等度</td> <td>中等度・高度</td> </tr> <tr> <th>剤型</th> <td>錠剤、OD錠*、細粒、ゼリー錠</td> <td>錠剤、OD錠*、液剤</td> <td>貼付薬</td> <td>錠剤</td> </tr> </tbody> </table> <p>*OD錠:水なしでも飲めるように、口の中で溶けるようになっている剤型</p>	一般名	ドネペジル	ガラントアミン	リバスチグミン	メマンチン	商品名	アリセプト	レミニール	リバスタッチイクセロン	メモリー	薬効	認知症の中核症状の進行をある程度遅らせる					抑うつや無関心にも効果	神経伝達物質の分泌を促進	貼付薬のため、使用しやすい <small>*服用法が正しく守られていること</small>	興奮や攻撃性に効果	主な副作用	消化器症状(悪心、下痢)		皮膚症状	めまい、頭痛、傾眠	適応	軽度～高度	軽度・中等度		中等度・高度	剤型	錠剤、OD錠*、細粒、ゼリー錠	錠剤、OD錠*、液剤	貼付薬	錠剤	<p style="text-align: center;">認知症の治療薬の一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>アリセプト</th> <th>レミニール</th> <th>リバスタッチイクセロン</th> <th>メモリー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>一般名</th> <td>ドネペジル</td> <td>ガラントアミン</td> <td>リバスチグミン</td> <td>メマンチン</td> </tr> <tr> <th>薬効</th> <td colspan="4">認知症の中核症状の進行を遅らせる</td> </tr> <tr> <td></td> <td>抑うつや無関心にも効果</td> <td>神経伝達物質の分泌を促進</td> <td>貼付薬のため、使用しやすい <small>*服用法が正しく守られていること</small></td> <td>興奮や攻撃性に効果</td> </tr> <tr> <th>主な副作用</th> <td colspan="2">消化器症状(悪心、下痢)</td> <td>皮膚症状</td> <td>めまい、頭痛</td> </tr> <tr> <th>適応</th> <td>軽度～高度</td> <td colspan="2">軽度・中等度</td> <td>中等度・高度</td> </tr> <tr> <th>剤型</th> <td>錠剤、OD錠、細粒、ゼリー錠</td> <td>錠剤、OD錠、液剤</td> <td>貼付薬</td> <td>錠剤</td> </tr> </tbody> </table> <p>*OD錠:水なしでも飲めるように、口の中で溶けるようになっている剤型</p>	商品名	アリセプト	レミニール	リバスタッチイクセロン	メモリー	一般名	ドネペジル	ガラントアミン	リバスチグミン	メマンチン	薬効	認知症の中核症状の進行を遅らせる					抑うつや無関心にも効果	神経伝達物質の分泌を促進	貼付薬のため、使用しやすい <small>*服用法が正しく守られていること</small>	興奮や攻撃性に効果	主な副作用	消化器症状(悪心、下痢)		皮膚症状	めまい、頭痛	適応	軽度～高度	軽度・中等度		中等度・高度	剤型	錠剤、OD錠、細粒、ゼリー錠	錠剤、OD錠、液剤	貼付薬	錠剤
一般名	ドネペジル	ガラントアミン	リバスチグミン	メマンチン																																																																				
商品名	アリセプト	レミニール	リバスタッチイクセロン	メモリー																																																																				
薬効	認知症の中核症状の進行をある程度遅らせる																																																																							
	抑うつや無関心にも効果	神経伝達物質の分泌を促進	貼付薬のため、使用しやすい <small>*服用法が正しく守られていること</small>	興奮や攻撃性に効果																																																																				
主な副作用	消化器症状(悪心、下痢)		皮膚症状	めまい、頭痛、傾眠																																																																				
適応	軽度～高度	軽度・中等度		中等度・高度																																																																				
剤型	錠剤、OD錠*、細粒、ゼリー錠	錠剤、OD錠*、液剤	貼付薬	錠剤																																																																				
商品名	アリセプト	レミニール	リバスタッチイクセロン	メモリー																																																																				
一般名	ドネペジル	ガラントアミン	リバスチグミン	メマンチン																																																																				
薬効	認知症の中核症状の進行を遅らせる																																																																							
	抑うつや無関心にも効果	神経伝達物質の分泌を促進	貼付薬のため、使用しやすい <small>*服用法が正しく守られていること</small>	興奮や攻撃性に効果																																																																				
主な副作用	消化器症状(悪心、下痢)		皮膚症状	めまい、頭痛																																																																				
適応	軽度～高度	軽度・中等度		中等度・高度																																																																				
剤型	錠剤、OD錠、細粒、ゼリー錠	錠剤、OD錠、液剤	貼付薬	錠剤																																																																				